

# NATURALIS®

## Přehled mísitelnosti s fungicidy

účinná látka	název produktu	mísitelnost
<i>Ampelomyces quisqualis</i> isolate M-10	AQ 10	A
azoxystrobin	QUADRIS	N
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> strain D747	AMYLO-X	A
<i>Bacillus subtilis</i> strain QST 713	SERENADE MAX	X
benalaxyl	GALBEN	A
bordeaux mix	různé	A
boscalid	CANTUS	A
bupirimate	NIMROD	N
captan	různé	N
chlorothalonil	DACONIL	N
hydroxid mědi	KOCIDE	A (0)
oxychlorid mědi	různé	A (0)
cyazofamid	RANMAN	A
cyflufenamid	TAKUMI	A
cymoxanil	CURZATE	N
cyproconazole	ATEMI / CADDY	N
cyprodinil	CHORUS	A
cyprodinil + fludioxonil	SWITCH	N
difenoconazole	SCORE 25 EC	A
dimethomorph	FORUM 50 WP	N
dimethomorph + měď	FORUM R	N
dodemorph	BASF - MEHLTAUMITTEL	X
dodine	SYLLIT 355 SC	N
famoxadone + cymoxanil	EQUATION PRO	X
fenamidone	ORACLE	A
fenhexamid	TELDOR	A
fenpyrazamine	PROLECTUS	N
fosetyl-aluminium	ALIETTE	A
fluopicolide + propamocarb	VOLARE	N

iprodione	ROVRAL	X
iprovalicarb	MELODY COMPACT	A
kresoxim-methyl	STROBY WG	N
mandipropamid	PERGADO	N
maneb	různé	X
mepanipyrim	FRUPICA	N
meptyldinocap	KARATHANE STAR	N
metalaxyl-M	CUMETA FLOW	A
metrafenone	VIVANDO	A
myclobutanil	THIOCUR	X
penconazole	TOPAS 10 EC	N
pencycuron	MONCEREN 250 SC	A
hydrogenuhličitan draselný	VITISAN	A
procymidone *	SIALEX	N
propamocarb	PREVITER	N
propineb	ANTRACOL	N
proquinazid	TALENDO	A
pyrimethanil	SCALA	N
quinoxifen	ARIUS	A
spiroxamine	PROSPER	N
síra	MICROTHIOL DISPERS	X
síra	HELIOSOUFRE S	A
tebuconazole	FOLICUR WG	N
thiophanate-methyl	různé	A
thiram	různé	X
triadimenol	BAYFIDAN	X
trifloxystrobin	FLINT	N

\* účinná látka není registrovaná dle Reg. (EC) No 1107/2009 jako přípravek na ochranu rostlin (zdroj: [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/?event=homepage](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage)).

(1) Pokud je tank-mix nezbytný, použijte nejnižší registrovanou dávku produktu

**A = ANO**, tank-mix **MOŽNÝ** bez výrazného snížení klíčivosti spór

**X =** nekompatibilní, aplikujte Naturalis® **2 dny** před nebo po aplikaci zmíněného fungicidu

**N = NE**, nekompatibilní, aplikujte Naturalis® **4 dny** před nebo po aplikaci zmíněného fungicidu

Všechny produkty byly testované v dávce uvedené na etiketě. Tank-mix Naturalisu s fungicidy opět pouze v dávce doporučené na etiketě. Nikdy nemíchejte Naturalis® s fungicidy v koncentrované dávce. Obchodní název partnerského fungicidu je uveden za účelem uvedení informace o testované formulaci účinné látky. Jiné formulace mohou mít jinou charakteristiku v tank-mixu.

V případě, že mícháme 2 a více fungicidů, vždy berte v úvahu horší variantu.

Toto vydání je pro mezinárodní účely, proto některé produkty nemusí být v CZ registrovány. Za škody způsobené použitím produktů uvedených v této tabulce nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

**Mísitelnost Naturalisu s insekticidy/akaricidy** není uvedená, protože **je možná s velkým množstvím účinných látek**, např. flonicamid (formulovaný produkt Teppeki), abamectin (formulovaný produkt Vertimec 1.8), spinosad (formulovaný produkt Laser), aniž by výrazně snižoval klíčivost spór.